

OPHTERGINE®

NOTICE

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT : **a) DÉNOMINATION :** OPHTERGINE®, pommade ophtalmique. **b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :** Oxyde mercurique jaune 1 g. Excipients : paraffine liquide, vaseline. Pour 100 g de pommade ophtalmique. **c) FORME PHARMACEUTIQUE :** Pommade ophtalmique, tube de 5 g. **d) CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :** ANTISEPTIQUE À USAGE OPHTALMIQUE. (S : organes sensoriels). **e) NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT :** **Titulaire et Exploitant :** HORUS PHARMA - 148 av. Georges Guynemer - Cap Var - 06700 Saint Laurent du Var. **f) NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :** TUBILUX PHARMA S.p.A. Via Costarica 20/22, 00040 POMEZIA - ROME - ITALIE. **2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ? (INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES).** Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections microbiennes ou parasitaires atteignant le bord de la paupière. **3. ATTENTION ! a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT : (CONTRE-INDICATIONS).** Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant : - Antécédent d'allergie aux dérivés mercuriels ou à l'un des autres constituants du collyre. Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin, dans le cas suivant : - en cas de traitement par un collyre ou une pommade ophtalmique contenant des antiseptiques iodés, (cf. Interactions médicamenteuses). EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **b) MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :** **Porteurs de lentilles :** En cas d'affection de la paupière, le port de lentille de contact est déconseillé pendant toute la durée du traitement. Par ailleurs, le port de lentilles de contact doit être évité durant le traitement en raison du risque de coloration de celle-ci. Ne pas utiliser de façon prolongée (plus de 7 jours) : en cas de persistance des symptômes au-delà de 7 jours ou d'aggravation des symptômes : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **c) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :** AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment un collyre ou une pommade ophtalmique contenant un antiseptique iodé, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN. **d) GROSSESSE – ALLAITEMENT :** D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament. **4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ? a) POSOLOGIE :** Voie locale. Appliquer sur la zone à traiter (bord externe de la paupière) une quantité de pommade équivalente à un grain de riz, 1 à 3 fois par jour. **b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :** Voie locale. Se laver soigneusement les mains. Appliquer sur la zone à traiter (bord externe de la paupière). Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'extrémité du tube. Reboucher le tube de pommade après application. **c) DURÉE DU TRAITEMENT :** Ne pas utiliser plus de 7 jours sans avis médical. **5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS :** (EFFETS INDÉSIRABLES). COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : Possibilité d'irritation locale : dans ce cas, arrêtez le traitement. SIGNALEZ À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE. **6. CONSERVATION : a) NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR. b) PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :** A conserver à une température inférieure à 25°C. **7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :** 28 Janvier 2008.