

ECOVITAMINE[®] B₁₂

0,05%, collyre en solution en flacon

Flacon de 10 ml - Sans conservateur

Composition qualitative et quantitative :

Cyanocobalamine.....0,05g pour 100 ml de collyre.
Liste des excipients : chlorure de sodium, phosphate disodique dodécahydraté, phosphate monosodique dihydraté, eau pour préparations injectables.

Indications thérapeutiques :

Traitement d'appoint des troubles de la cicatrisation cornéenne.

Posologie et mode d'administration :

Voie locale. En instillation oculaire. Instiller 1 goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur, 3 à 4 fois par jour, en fonction des troubles oculaires.

Contre-indications :

Hypersensibilité à l'un des composants du produit.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Ne pas injecter, ne pas avaler.

En raison de la coloration du collyre à la Vitamine B12, le port des lentilles de contact est déconseillé pendant toute la durée du traitement. En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre les 2 instillations. Ne pas toucher l'œil avec l'embout du flacon. Fermer le flacon après utilisation.

Effets indésirables :

Possibilité de réactions allergiques.

Propriétés pharmacodynamiques :

Médicament à usage ophtalmique, à visée cicatrisante (S : organe sensoriel).

Données pharmaceutiques :

Ce collyre sans conservateur est présenté dans un flacon multidose ABAK[®] équipé d'un dispositif comportant une membrane filtrante (0,2 microns) afin de protéger le collyre contre la contamination microbienne pendant la période d'utilisation.

Durée de conservation :

Avant ouverture : 2 ans.

Après ouverture : 4 semaines.

Précautions particulières de conservation :

Après ouverture, le flacon ne doit pas être conservé au delà de 4 semaines.

Nature et contenu de l'emballage extérieur :

10 ml en flacon (PE) avec stilligoutte équipé d'un filtre antimicrobien (polyamide).

Instructions pour l'utilisation et la manipulation, et l'élimination :

Pour obtenir un bon fonctionnement du flacon, il est important de respecter les manipulations suivantes :

Avant la première utilisation :

- Vérifier que l'enveloppe en matière plastique transparente n'est ni ouverte ni détériorée.
- La déchirer et dégager le flacon.

Instillation :

- Tenir le flacon en position verticale et visser à fond le bouchon pour enfoncer l'embout.
- Dévisser le bouchon pour ouvrir le flacon. Constater la position enfoncée de l'embout. Le flacon se trouve alors en position de fonctionnement.
- Retirer la capsule de fond du flacon afin de dégager le soufflet, en « séparant » les deux éléments.
- Retourner le flacon et le tenir entre le pouce et le majeur. Instiller 1 goutte dans l'œil (en regardant vers le haut et en tirant la paupière vers le bas), en appuyant sur le soufflet avec l'index, sans relâcher jusqu'à l'apparition d'une goutte. Reboucher le flacon après instillation.

Date de mise à jour du texte :

24 mars 2005

Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché :

356 243-1

Prix Public conseillé : 9,90 €

Non remboursé par la Sécurité Sociale.

Titulaire :



Cap Var C1
06700 - Saint Laurent du Var
France
Tél : 04 93 19 54 03
Fax : 04 93 19 54 09

