

NOUVEAU Collyre antiseptique
MONOSEPT[®]
Bromure de céthexonium

MONOSEPT[®] 0,25% (0,1 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose. COMPOSITION : Bromure de céthexonium 0,1 mg pour un récipient unidose de 0,4 ml. Excipients : chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. DONNÉES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Traitement antiseptique des affections superficielles de l'œil et de ses annexes. Posologie et mode d'administration : Voie locale. EN INSTILLATION OCULAIRE. Instiller 1 goutte, dans le cul-de-sac conjonctival inférieur, en tirant la paupière inférieure légèrement vers le bas et en regardant vers le haut, 3 à 4 fois par jour, pendant 7 jours en moyenne. Contre-indications : Antécédents d'allergie au céthexonium ou autres ammoniums quaternaires. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi : En cas d'hypersensibilité, interrompre le traitement. Le traitement doit être limité à 15 jours : l'utilisation intensive ou prolongée peut être à l'origine d'altérations de l'épithélium conjonctival et (ou) cornéen. La prudence s'impose notamment en cas d'anomalies épithéliales. Éviter l'utilisation chez les porteurs de lentilles de contact : les ammoniums quaternaires peuvent être adsorbés par les lentilles hydrophiles et être à l'origine d'intolérance locale de celles-ci. En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent, espacer de 15 minutes les instillations. L'unidose doit être jetée immédiatement après usage et ne doit pas être conservée en vue d'une réutilisation lors des administrations suivantes. Ne pas toucher l'œil avec l'embout de l'unidose. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions : Ne pas associer deux antiseptiques. En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent, espacer de 15 minutes les instillations. Effets indésirables : Possibilité de réaction d'intolérance locale (cf Précautions d'emploi). Risque de réaction d'hypersensibilité. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : Antiseptique local (S = organe des sens).

Le céthexonium est un antiseptique appartenant à la classe des ammoniums quaternaires. Propriétés pharmacocinétiques : Les propriétés mouillantes des ammoniums quaternaires favorisent leur passage à travers la cornée. DONNÉES PHARMACEUTIQUES : Durée de conservation : 18 mois. Précautions particulières de conservation : A conserver à une température inférieure à 25°C. Ne pas conserver après utilisation. Nature et contenance du récipient : 0,4 ml en récipient unidose (PE) ; Boîte de 30. Instructions pour l'utilisation, la manipulation et l'élimination : Chaque récipient unidose contient environ 10 gouttes. Pour utiliser l'unidose, procéder de la manière suivante : • Lors de la première utilisation, ouvrir l'enveloppe dans laquelle est conditionnée une plaquette d'unidoses. • Sortir la plaquette de son enveloppe protectrice et en détacher une unidose. • Pour ouvrir l'unidose, effectuer vigoureusement une rotation complète de la partie plate afin de rompre la soudure. • Renverser l'unidose, afin d'en faire descendre le contenu vers l'extrémité ouverte. • Instiller le collyre dans l'œil ou les yeux à traiter en pressant légèrement l'unidose. • Jeter l'unidose après utilisation. AMM : 363 668-4 (1997, révisée 25/05/2004) : 30 récipients unidoses de 0,4 ml (polyéthylène). Prix : 3,80 €. Remb. Séc. Soc à 65 %. Agréé Collect.

Le fichier utilisé pour nous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions des articles 34 et suivants de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification auprès du Pharmacien Responsable de notre Laboratoire.

**4 monodoses par jour
pendant 7 jours :**

1 boîte = 1 traitement